# SD-Ura-Ade with Agar (固体预混培养基)

## 制品内容

| 货号 | 名称 | 规格 |
|---|---|---|
| QM3107S-5×0.2 L | SD-Ura-Ade with Agar | 5×0.2 L |
| QM3107S-10×0.2 L | SD-Ura-Ade with Agar | 10×0.2 L |
| QM3107S-50×0.2 L | SD-Ura-Ade with Agar | 50×0.2 L |

## 产品简介

SD/–Ura/–Ade 为酵母筛选用培养基，是一种由确定成分组成的全合成酵母培养基。SD/–Ura/–Ade 只缺失尿嘧啶、腺嘌呤，含有除尿嘧啶、腺嘌呤外的 20 种氨基酸，因此可以用来筛选含有表达尿嘧啶、腺嘌呤合成基因的质粒的酵母菌株，或用来激活相关报告基因，广泛用于酵母互作和酵母离子耐受，功能互补及各种野生型酵母，部分突变型酵母的鉴定、筛选和培养试验。

## 保存

室温干燥。

## 使用说明

SD/–Ura/–Ade Broth为SD/–Ura/–Ade液体培养基，取SD/–Ura/–Ade Broth培养基一袋，加蒸馏水150 mL搅拌溶解后，定容到0.2 L(不用调 pH 值)，121 ℃-15 min 高压灭菌，灭菌后温度降到 30 ℃以下使用。

SD/–Ura/–Ade with Agar为SD/–Ura/–Ade固体培养基，取SD/–Ura/–Ade with Agar培养基一袋，加蒸馏水150 mL溶解(Agar不溶)，定容到0.2 L(不用调 pH 值)，121 ℃-15 min 灭菌，灭菌后温度降到 55 ℃以下倒平板即可。

**该产品在常温下（ 25 ℃ ）pH 值为：5.8 ± 0.1。**

## 注意事项

1）若发现有严重吸潮现象，停止使用。

2）若配制少于0.2 L,按每比例加入即可，剩余培养基可封口后放干燥处保存。

3）葡萄糖可以 121 ℃-15 min 或 115 ℃-20 min 灭菌，灭菌后培养基颜色偏棕黄色，对酿酒酵母生长影响不大。

4）本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。

5）为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 产品组分与配方

| Component | Broth Formulation/L | with Agar Formulation/L |
|---|---|---|
| YNB(No amino acids) | 6.7 g | 6.7 g |
| DO Supplement-Ura/–Ade | 0.73 g | 0.73 g |
| Glucose | 20 g | 20 g |
| Agar | | 20 g |