# 缺镁木村B水稻营养液（干粉+浓缩液）

## 制品内容

| 货号 | 名称 | 规格 |
|---|---|---|
| QM4158-500 L | Kimura B nutrient salts (-Mg) | 500 L |
| QM4158-1000 L | Kimura B nutrient salts (-Mg) | 1000 L |

## 产品简介

缺镁木村B水稻营养液（干粉+浓缩液）在植物生理学、植物营养学、农学等领域具有广泛应用。它可用于研究镁元素对水稻生长和发育的影响，以及探索其他营养元素在缺镁条件下的作用机制。此外，该营养液还可用于指导水稻的种植和无土栽培实践，特别是在缺镁土壤或特定科研需求下，为水稻提供适宜的营养支持。

## 保存

2-8℃，避光保存。

## 使用方法

1）按照产品说明书中的比例将干粉和浓缩液混合，如干粉120 mg/L，加0.2 ml/L 5000×钙浓缩液。

2）用适量的水溶解混合后的营养液，并调整至适当的pH值（一般为5.5~5.8）。

3）将配制好的营养液浇灌或喷洒于水稻植株上，根据水稻的生长阶段和需求进行适量施用。

## 注意事项

1）在使用前，请仔细阅读产品说明书，并按照说明书上的比例和方法进行操作。

2）避免与其他化学物质混合使用，以免产生不良反应。

3）如果出现沉淀或结块等现象，应停止使用，并检查产品是否过期或变质。

4）使用过程中，请注意观察水稻的生长情况，如有异常应及时调整营养液配方或施用方法。

5）该产品不适宜制备高浓度母液，否则会有沉淀产生。

## 产品组分（mg/L）：

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 干粉混合物 | $(NH_4)_2SO_4$ | 48.2 | $H_2MoO_4 \cdot H_2O$ | 0.09 |
| | $KH_2PO_4$ | 24.8 | $H_3BO_3$ | 2.86 |
| | $KNO_3$ | 18.5 | $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ | 0.22 |
| | $K_2SO_4$ | 15.9 | $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ | 0.08 |
| | $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ | 1.81 | NaFeEDTA | 7.34 |
| 钙浓缩液（5000×） | $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ | | 86.4 | |



江西其云生物有限公司
Jiangxi qiyun Biotech Co., Ltd
www.qiyunbio.com
400-886-5210